

Aranyos rózsabogár / rezes virágbogár -

Cetonia a. aurata L. / *Potosia cuprea* F.

Az aranyos rózsabogár nagyjából téglalap alakú, 14-23 mm-s, élénk fémfényű, legtöbbször aranyoszöldes bogár. A szárnyfedőkön néhány harántos, vékony fehér folt van. A lábszárakon soha sincs fehér térdfoltocska. A rezes virágbogár igen hasonló, általában olajoszöld színű, hasoldala fémes ibolyalila. Lábszárain fehér térdfoltocska van. A két fajt legkönnyebben a mellközép nyúlványa alapján lehet megkülönböztetni: ez az aranyos rózsabogárnál gömbölyű gombban, míg a rezes virágbogárnál lapos nyúlványban végződik.

Tápnövénye: a bogarak kárt elsősorban virágok, **rózsa, nőszirm**, más dísznövények, stb.) megrágásával okoznak. Az utóbbi években egyre több helyről jelezték ezen kívül károsítását éredő **őszibarackon és kajszin** is. A bogarak a gyümölcs héja alá lyukat rágnak, így felületes szemlélő nem is veszi észre, hogy a gyümölcs "lyukas". A lárva (pajor) talajlakó; korhadó növényi részekkel táplálkozik, kárt nem okoz.

A virágbogár csapdát a gyümölcsösben az **alsó ágakra**, dísznövény-ültetvényben a virágok szintjén, karó mellé rögzítve helyezzük ki. Rendkívül lényeges, hogy a csapda **kék** színű tölcséres része a nap folyamán minél tovább kapjon **napfényt**; az árnyékos helyen levő csapdába a bogarak nem szívesen repülnek bele! A csapdázás megkezdésének szokásos időpontja **május eleje**, de mindenképpen célszerű a barackérés kezdete előtt néhány nappal kirakni a csapdákat!

A **CSALOMON®** csapda **szelektivitása**: csalétkünk virág illatanyag, melynek csalogató hatását az élénk kék szín tovább fokozza. Az aranyos rózsabogáron és a rezes virágbogáron kívül nagy számban foghat sokpettyes virágbogarat (*Oxythyrea funesta*). Ez jóval kisebb (10-14 mm), fémfényű fekete, enyhén szőrös, szárnyfedőjén fehérfoltokkal. Ez a faj szintén okozhat károkat a virágok / gyümölcsök megrágásával, tehát befogása nem előnytelen. Helytől függően jelentős mennyiségben jöhet még a csapdába a szintén kártevő bundásbogár (*Epicometis hirta*) is (erre a fajra célzottan optimalizált csapda is kapható!). Csapdáink virágbogár fogását megnövelhetjük, ha



Potosia cuprea



Cetonia aurata

A bogár, amit a csapda fog



Photo: Vuts J.

VARb3k csapda, aranyos és rezes virágbogár fogással



www.lucianabartolini.net

A bogár és a kártétel, amit meg kell előznünk

egy-egy negyed almát helyezünk a fogóedénybe. Ebben az esetben viszont számolhatunk más rovarok (darazsak, lepkék, stb.) berepülésével is, melyek az erjedő gyümölcs illatára szállnak a csapdába.

A CSALOMON® csapda **vonzóképessége**: környezeti viszonyoktól függően 3-4 hét után lassan csökkenhet. Ezután a csalétket a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje frissre!

A virágbogarak elleni védekezésben a csapdák alkalmazása sokkal egyszerűbb, mint az eddig szokásosan alkalmazott módszereké, továbbá a csapdák érzékenyen jelzik a kártevő megjelenését. Így a betelepülés iránya, a fertőzési gócok könnyen behatárolhatók, majd felszámolhatók. A nagy fogókapacitású **VARb3k** csapda típus a kártevők **gyérítésére**, és a **kártétel szintjének csökkentésére** is alkalmas! Előzetes megfigyeléseink alapján a csapdázás akkor lehet eredményes, ha a csapdákat 10 - 15 m-es kötésben helyezzük ki, és követjük velük a kártétel lehetséges helyét (pl. az érés előtt álló őszibarack fajtákat)[1]. Ha a bogaraknak a peterakás céljára csalogató peterakóhelyeket készítünk (felásott talaj szalmaszecsckával összekeverve, növényi maradványokkal letakarva), a kikelő lárvák talajinszekticidekkel könnyen elpusztíthatók[2].

[1] Voigt E. és mtsi, *Agrofórum*, 16:63-64, 2005(2). [2] Jermy T., Balázs K. (szerk.) *A növényvédelmi állattan kézikönyve IIIA. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.*



A **Csalomon** az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>; internet:

<www.julia-nki.hu/csalomon>

Kártétel
barackon,
egy
gradációs
évben



Fotó: Nikl F..



Fotó: Nikl F..



Fotó: Nikl F..

Fotó: Nagy Z. L.



Fotó: Nagy Z. L.



Így néz ki, ha a
CSALOMON® VARb3k
csapda megfogta!