

## Kis rügysodró - *Recurvaria nanella* Hbn.

A lepke szárny-fesztávolsága 11-12 mm. Elülső szárnya szürke, tövénél egy keresztcsáv, középső részén egy hosszanti csík, csúcsánál pedig két fekete folt látható.

A hernyó tápnövénye: alma, körte, kajszli, szilva, cseresznye, őszibarack, birs, naspolya, mandula, meggy, málna, ribiszke, köszméte.

**Kárképe:** a nyár folyamán elágazó aknák a levélben (a petéből kikelő hernyó rágása); télen szövedéktok a koronában (benne telet át a hernyó);

tavasszal rágás a fakadó rügyeken, összesodort friss hajtások (áttelelt, kifejlett hernyó). A hernyó tápnövénye: alma, körte, kajszli, szilva, cseresznye, őszibarack, birs, naspolya, mandula, meggy, málna, ribiszke, köszméte. **Kárképe:** a nyár folyamán elágazó aknák a levélben (a petéből kikelő hernyó rágása); télen

szövedéktok a koronában (benne telet át a hernyó); tavasszal rágás a fakadó rügyeken, összesodort friss hajtások (áttelelt, kifejlett hernyó).



[www.ilpolliceverde.it](http://www.ilpolliceverde.it)



[www.ilpolliceverde.it](http://www.ilpolliceverde.it)



[www.ilpolliceverde.it](http://www.ilpolliceverde.it)

**A lárva és kártétele, amit meg kell előzünk**



[ukmoths.org.uk](http://ukmoths.org.uk)

**A lepke, amit a csapda fog**


A feromoncsapdát 1,5 - 2 m magasságban, a lombkoronába, lombos ágra akasszuk. A csapdázás megkezdésének szokásos időpontja május vége.

A CSALOMON® csapda szelektivitása: más lepke csak véletlenszerűen repül be a csapdába.

A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 4-6 hét. Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra! Ragacslapcsere: a fogástól függően, szükség szerint (általában 7-10 naponként.) Feromoncsapdáinkkal kiválóan követhetjük a lepkék megjelenését és rajzásmenetét. A kártevő rajzása általában elhúzódó, számára kedvező év esetén több rajzáscsúcs is kialakulhat. A védekezésre ajánlott szerek: virágzás után a kifejlett hernyók ellen az Insegar 25WP[1];

Igen kedvezőnek tűnik a Match 50EC használata [2]. A peték, illetve a belőlük kikelő kis hernyók ellen később használható szerek a Nomolt 15SC, illetve a Dimilin 25WP [1]. (A rovarölőszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi előírásokat!) Vegye tekintetbe az alternatív védekezési módszereket is! [3] A kis rügysodrómoly hím lepkék fogására alkalmas feromoncsapda kifejlesztését világelsőként a magyar kutatók végezték el! [4]

[1] Növényvédő szerek, termésmenvelő anyagok. Évente megjelenő kiadvány, beszerezhető: megyei Növényvédő (NTSZ) Állomások; [www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html](http://www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html); WIN-PESZTI ([www.relemi.hu](http://www.relemi.hu)) [2] Szabó és mtsi (eds): Integrált termesztés a kertészetben, 15, BFNTÁ, 1994. [3] Biogazda 2., Biokultúra Egyesület, 1994. [4] Tóth M. és Doolittle, R. Növényvédelem 29: 110-116, 1993.



az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <[csalomon@julia-nki.hu](mailto:csalomon@julia-nki.hu)> vagy <[h2371tot@ella.hu](mailto:h2371tot@ella.hu)>; internet: <[www.julia-nki.hu/csalomon](http://www.julia-nki.hu/csalomon)>



Fotó: Nagy Z. L.

Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!